

## DESCRIPTION

D'UN

### “ RUTELINÆ „ NOUVEAU DU CONGO BELGE


PAR

E. BENDERITTER

---

#### *Rhinyptia bilaminiceps* n. sp.

Testacé brillant. Tête à ponctuation médiocre; déprimée au milieu. Épistome teinté de cuivreux, prolongé en avant en deux longues lames, concaves, sinuées extérieurement, relevées à l'extrémité, la pointe émoussée. Joux largement arrondies. Corselet à ponctuation forte, régulière, une petite fossette près des bords latéraux, ceux-ci entièrement rebordés jusqu'à l'angle postérieur; base antérieure rebordée, base postérieure non rebordée, un peu avancée et tronquée devant l'écusson. Écusson ovalaire, l'extrémité arrondie, ponctué. Élytres à ponctuation forte, séparée; une côte suturale et deux autres sur le disque lisses, les côtés ponctué en lignes; suture brune. Pygidium couvert de gros points, muni de longs poils blancs dans sa moitié postérieure. Tibias antérieurs bidentés; dents longues, aciculées.



Longueur 6  $\frac{1}{2}$  mm., largeur 4 mm.

Un exempl. ♂ de Sankisia (D<sup>r</sup> RODHAIN).

Très voisin de *rostrata* BURM. S'en distingue par la couleur un peu plus rougeâtre et surtout par les lames de l'épistome plus longues, largement séparées dès leur naissance; l'écusson moins triangulaire et moins large à la base.

---